癌化学療法プロトコール申請用紙

委員長	登録者	登録監査
印	印	印

登録番号 G-10

申請日 2020/06/19

申請科 外科

日常診療(ガイドライン)	○
自主研究(JCOGなど)	
製造販売後臨床試験	
治験	
倫理委員会承認済み	

癌腫・疾患	膵癌
対象	進行・再発
療法名_略号など	オニバイド+5-FU/L-LV併用療法

1クールの日数	14日
通常のクール数	規定なし
クール間の休薬日数	

	薬品名 (抗癌剤 のみ)	規格単位	成分名	略名	投与量	単位	day 1	day ～	day 14
注	イリノテカン	43mg 10mL	イリノテカン		70	mg/m2	↓		休
注	5フルオロウラシル	(1000mg20mL)(250mg5mL)	5フルオロウラシル	(5－FU)	2400	mg/m2	↓		休
	レボホリナート	25mg、100mg	レボホリナート	(I-LV)	200	mg/m2	↓		休

内服支持薬 アプレピタント(d1:125mg、d2:80mg、d3:80mg)□1×、デカドロン錠4mg2×(d2－3)

投与手順

《主 管》

投与日	処方番号	薬品名	投与量	単位	手技	時間	コメント
第1, 15日目							
	①	生理食塩液	100	mL			ルートキープ
	③	5%糖液	500	mL		90分	
		オニバイド	70	mg/m2			
	⑥	生理食塩液	100	mL			
							フラッシュ用

←

《側 管》

投与日	処方番号	薬品名	投与量	単位	手技	時間	コメント
第1, 15日目							
	②	アロキシバッグ50mL	0.75	mg		30分	
		デカドロン	4.95	mg			
		5%糖液(250mL)	250	mL	点滴静注	120分	
		アイソボリン	200	mg/m2			
	⑤	5%糖液(100mL)	適量	mL	点滴静注	46時間	
		5-FU	2400	mg/m2			
							インフューザーの場合は230mLで調製 その他は500mLで調製