癌化学療法プロトコール申請用紙

委員長	登録者	登録監査
印	印	印

登録番号 G-06

申請日 2016/02/09

申請科 外科

日常診療(ガイドライン)	○
自主研究(JCOGなど)	
製造販売後臨床試験	
治験	
倫理委員会承認済み	

癌腫・疾患	膵癌
対象	治癒切除不能な膵癌
療法名_略号など	FOLFIRINOX

1クールの日数	14日
通常のクール数	規定なし
クール間の休薬日数	13日

	薬品名 (抗癌剤 のみ)	規格単位	成分名	略名	投与量	単位	day 1	day 2	day ～	day 14
注	オキサリプラチン	100mg20mL	オキサリプラチン	(L−OHP)	85	mg/m2	↓			
注	レボホリナート	25mg、100mg	レボホリナート	(I-LV)	200	mg/m2	↓			
注	イリノテカン	(100mg5mL)(40mg2mL)	イリノテカン	(CPT-11)	180	mg/m2	↓			
注	5フルオロウラシル	(1000mg20mL)(250mg5mL)	5フルオロウラシル	(5−FU)	400	mg/m2	↓			
注	5フルオロウラシル	(1000mg20mL)(250mg5mL)	5フルオロウラシル	(5−FU)	2400	mg/m2	↓	↓		

内服支持薬 アプレピタント(d1:125mg、d2:80mg、d3:80mg)□1×、デカドロン錠4mg2×(d2−3)

投与手順

《主 管》

投与日	処方番号	薬品名	投与量	単位	手技	時間	コメント
第1日目							
	①	生理食塩液	100	mL			ルートキープ
	②	アロキシバッグ50mL	0.75	mg	点滴静注	15分	
		デカドロン注射液	9.9	mg			
	③	5%糖液(250mL)	250	mL	点滴静注	120分	
		オキサリプラチン	85	mg／m2			
	④	5%糖液(250mL)	250	mL	点滴静注	120分	
		レボホリナート	200	mg/m2			
	⑤	5FU注射液	400	mg／m2	点滴静注	15分	
		5%糖液(100mL)	100	mL			
	⑥	5FU注射液	2400	mg／m2			
		5%糖液	適量	mL	点滴静注	46時間	
							インフューザーポンプの場合は230mLで調製
							その他はブドウ糖液500mLで調製
	⑦	生理食塩液	100	mL			
							入院の場合のフラッシュ用

←

《側 管》

投与日	処方番号	薬品名	投与量	単位	手技	時間	コメント
第1日目							
	④	5%糖液(250mL)	250	mL	**点滴静注**	90分以上	
		イリノテカン	180	mg／m2			
							主管④投与開始30分後に投与